05

# 咀嚼に大切な歯のお話

## 萌出の時期と順序







| | | 男児 | |
|---|---|---|---|
| | 歯種 | 萌出開始年齢 | 萌出順序 |
| 上顎 | A | 9か月 | 2 |
| | B | 11か月 | 3 |
| | C | 1歳 5か月 | 7 |
| | D | 1歳 4か月 | 5 |
| | E | 2歳 6か月 | 10 |
| 下顎 | A | 7か月 | 1 |
| | B | 1歳 0か月 | 4 |
| | C | 1歳 5か月 | 7 |
| | D | 1歳 4か月 | 5 |
| | E | 2歳 3か月 | 9 |

| | | 女児 | |
|---|---|---|---|
| | 歯種 | 萌出開始年齢 | 萌出順序 |
| 上顎 | A | 9か月 | 2 |
| | B | 11か月 | 3 |
| | C | 1歳 6か月 | 7 |
| | D | 1歳 4か月 | 5 |
| | E | 2歳 6か月 | 10 |
| 下顎 | A | 8か月 | 1 |
| | B | 1歳 0か月 | 4 |
| | C | 1歳 6か月 | 7 |
| | D | 1歳 4か月 | 5 |
| | E | 2歳 3か月 | 9 |

日本小児歯科学会HP より抜粋

歯の生え方は男女差がある。

## 歯が生え始めて噛み合わせが完成する目安

**第2乳臼歯が生え揃う3歳頃で完成！**
上顎の歯が生え揃うとともに
食べられるようになるわけではなく、
3歳前後できちんと食べられるようになる。

## 乳歯のすき間は全然OK！



## 顎の骨の成長のピークは上下で違う！

**上顎：6～8歳**
**下顎：男子：8歳頃、女子：5歳頃までに成長**
**下顎の成長は、第二次性徴に合わせて起こるので、上顎の成長より遅れてくる**

## 顎の骨の成長のピークは意外と早い！

上顎は神経型（スキャモン氏曲線の緑）の成長と付随するので、成長がゆっくり。(A=Z,B=3の部分)




下顎は一般型（スキャモン氏曲線の緑）の成長と付随するので、成長がゆっくり。(A=Z,B=3の部分)

*Handbook of Facial Growth" Donald H. Enlow

## スキャモンの発達曲線




## 小児における口腔機能発達不全症が保険適用になりました

口腔機能発達不全症は、先天性の疾患などがない健常児において、食べる・話す・呼吸などの機能が十分に発達していない、もしくは正常な機能を獲得できていない状態を指す概念。

これに当てはまる場合、歯科や耳鼻科などの専門的な支援を必要としていると言える。

**"食べる"機能不全**
- 生えてくるのが遅い歯がある
- 歯列不正（出っ歯、受け口、ガタガタ並んでいる）がある
- 偏みを伴うような大きな虫歯がある
- 食事中によく食べこぼす
- クチャクチャと音をたてて食べている
- 噛まずに丸呑みしてしまう癖がついている、など。

**"話す"機能不全**
- 普段から口の前歯が口元から見えている
- 口を閉じると唇元にシワができる
- 舌を前に出すとハートの形になる
- 口を開けたまま舌で上の前歯を触れている

**"呼吸"機能不全**
- 口が乾燥している
（口呼吸が癖になっていることがあります）
- 鼻がつまっていなければでもないのに、口で息をしている
- いびきをかいて寝ている
- 仰向けで寝始めたのに横向きやうつ伏せで寝ていることが多い
- 食べ物が飲み込みにくそう、など。

**・鼻炎・鼻詰薄目が当てはまる場合**
**・口腔機能発達不全症として保険適用になる**

小児歯科学会HPより
お近くの小児歯科専門医を検索できる
https://www.jspd.or.jp/facility_search/

これらの機能不全、子どもたち自身が"異常"として認識していないことが多く、最初に気付くのは母親。普段から一緒に生活している保護者であることが望ましい。

## MFTトレーニング（口腔筋機能療法）

**MFTの一例・ホッピング**
- 舌先を上顎につけて、舌全体を口蓋に持ち上げる
- 口を大きく開け、舌の形をできるだけ伸ばす
- 舌で口蓋をはじくようにし、「ポン」と音を鳴らす

## 乳歯は永久歯へと変わる

6歳頃～13歳頃まで乳歯から永久歯への生え変わり、新しい歯が生えてきて口の中は不安定です
不安定な状態にこそ、根気強く正しくしっかり噛む正しい食べ方を意識、その基礎は離乳食。

## のどの容積は9～11歳で増大する

成長期の中間期頃の容積は歯科前が去がるについて増加する傾向にある

**男児H目期：上顎切歯が生えてくる**
- 9歳～　第二小臼歯の萌出が完了する
- 約11歳頃から増加

**女児III C期：第二大臼歯萌出開始**
- 約11歳から急激な増加が認められた

引用画像：小児の摂食機能リハビリテーション第2版

## 哺液は咀嚼に超大切！

**哺液には5つの役割がある**

1. 口の中を清潔に保つ
2. 食べ物を飲み込みやすくする
3. 消化を助ける
4. 全身の健康を保つ
5. 味を感じやすくする

## 離乳食が始まったら歯磨きはしたほうが良い？

- 歯が萌出したら、食後に歯ブラシやアの習慣を作りましょう
- 食後の口腔ケアを習慣化しておくと幼児期に効果的です
- この時期はとても敏感なので無理強いせず優しく進めましょう

よくおにある指導作用があるので1回歯がなかったら妥協になる！ということはない。
市販では1include歯ブラシが販売されており、特に出たがり時に便利。使い捨てなので衛生的に使えますのでおすすめ。
出先で磨歯ができない時！というときは食後にお茶をせて口の中をさわいでいすればOK。

## 乳幼児期の食器は別々にしなくてOK

（日本口腔保健協会からの新情報）

- 気にしすぎる必要性なし
- 離乳食期よりも前に親から虫歯菌は移っています
- 未治療の虫歯があれば治療しましょう

だらだら食べない、甘い物とのけさ合いカ・フッ素を利用した歯磨き習慣が大切になってくる。