

モビコール®配合内用剤HD モビコール®配合内用剤LD

を服用される方へ

モビコール®は水に溶かして
服用してください。



モビコール®を水に溶かす量は…

HD

LD




1包あたり約120mL
(コップ2/3杯程度)

1包あたり約60mL
(コップ1/3杯程度)



2包の場合は約240mL

2包の場合は約120mL



3包の場合は約360mL

3包の場合は約180mL

⋮


溶かした後
すぐに服用できない場合は…



冷蔵庫で保管する

※できるかぎり速やかに服用してください。

数回に分けて
服用してもかまいませんが…



その日中に飲みきる

※できるかぎり速やかに服用してください。

「モビコール」及び MOVICOL は、Norgineグループの登録商標です。

モビコール®配合内用剤HD

モビコール®配合内用剤LD

飲み合わせ表

基本編

モビコール®は水に溶かして服用してください。



応用編

味などが気になって服用しにくい場合は、水の代わりに下記の飲み物を混ぜるとモビコール®を服用しやすくなります。医師・薬剤師にご相談ください。

甘味がないもの		相性(5段階)
お茶		★
コーヒー (ブラック)		★
紅茶 (ストレート)		★★
牛乳		★★★★

温かいもの		相性(5段階)
ミルクココア		★★★★★
コーンスープ		★★★★★
お味噌汁 お吸い物		★★★★★

甘味のあるもの		相性(5段階)
ヨーグルト 飲料		★★★★★
オレンジ ジュース		★★★★★
りんご ジュース		★★★★★
スポーツ ドリンク		★★★★★
乳酸菌 飲料		★★★★★

相性

★ ← 塩味 → ★★★★★★
(感じる) (感じにくい)

※嗜好は個人によって異なりますのであくまで参考とし、医師、薬剤師の指示に従って服用してください。
※温かいものにモビコール®を溶かす場合は30～40℃まで冷ましてください。

小児(2歳以上)で
モビコール®を服用される方へ

- 濃度の濃いジュース類は薄めながら飲ませると良いでしょう。
- カフェインが含まれているものはなるべく避けましょう。
- より短時間に溶解させる工夫として、シェーカーを使うと良いでしょう。